

Gebrauchsinformation

Spiraphan

Homöopathisches Arzneimittel

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen:

Nicht anwenden in der Schwangerschaft und bei Chininüberempfindlichkeit, Überempfindlichkeit gegen Ginkgo-biloba-Zubereitungen, Arnica und anderen Korbblütlern.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Die Wirkung von gerinnungshemmenden Arzneimitteln kann verstärkt werden (Ginkgo biloba).

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Warnhinweise:

Enthält 63 Vol.-% Alkohol

5 Tropfen enthalten 80 mg Alkohol.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen:

Bei Einnahme des Mittels können Völlegefühl und Übelkeit auftreten, wenn die Einnahme vor den Mahlzeiten erfolgt. Es ist dann nach den Mahlzeiten einzunehmen.

In Einzelfällen können allergische Hautreaktionen auftreten.

In seltenen Fällen kann die Haut lichtempfindlich sein.

Hinweis: Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Heilpraktiker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum. Nicht über 25°C lagern.

Zusammensetzung:

10 ml (9,1 g) Mischung enthält:

arzneilich wirksame Bestandteile:

Latrodectus mactans (HAB 34) Dil. (HAB, V. 4b, ø mit Ethanol 86% m/m)	D 8	1,0 ml
Secale cornutum Dil.	D 6	1,0 ml
Pulsatilla pratensis Dil.	D 6	1,5 ml
Chininum hydrochloricum Dil.	D 4	1,5 ml
Ginkgo biloba Dil.	D 3	1,0 ml
Filipendula ulmaria	ø	0,5 ml
Melilotus officinalis	ø	0,5 ml
Ruta graveolens	ø	0,5 ml
Aesculus hippocastanum	ø	1,0 ml
Arnica montana Dil.	D 2	1,0 ml

sonstiger Bestandteil: Ethanol 43% (m/m)

1 ml (0,91 g) entspricht 31 Tropfen

Darreichungsform und Inhalt:

20, 50, 100 ml Mischung zum Einnehmen

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Kattwiga Arzneimittel GmbH, Postfach 2567, 48514 Nordhorn

Stand der Information: März 2018