

Sanukehl® Coli D7 Flüssige Verdünnung zur Injektion



Darreichungsform:	Flüssige Verdünnung zur Injektion
Präparatgruppe:	Bakterienpräparate
Wirkstoff:	Escherichia coli extractum cellulae (lyophil., steril.) Dil. D7 aquos.
Zusammensetzung:	1 Ampulle enthält: Wirkstoff: 1 ml Escherichia coli extractum cellulae (lyophil., steril.) Dil. D7 aquos. (HAB, Vorschrift 5b).
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren 1–3x wöchentlich 1 ml s.c. injizieren. Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte Sanukehl® Coli D7 abgesetzt werden.
Nebenwirkungen:	Aufgrund des Gehaltes von Sanukehl® Coli D7 an spezifischen organischen Bestandteilen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.
Gegenanzeigen:	Nicht anwenden bei: • bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Escherichia coli • Autoimmunerkrankungen • Kindern unter 12 Jahren • Schwangeren und Stillenden
Unerwünschte Reaktionen:	
Wechselwirkungen:	Immunsuppressiv wirkenden Arzneimittel oder Therapien können die Wirksamkeit von Sanukehl® Coli D7

beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.

Vorsichtsmaßnahmen: Keine bekannt.

Hinweis:

Dauer der Behandlung:

Handelsform: 1/10/50 Ampullen à 1 ml PZN 07709517/07709523/07709546.

Stand vom: 03/2016