

eviprostat-S sabal serrulatum 320 mg UNO

Weichkapseln

Zur Anwendung bei erwachsenen Männern

Wirkstoff: Sägepalmenfrüchte-Dickextrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss eviprostat-S sabal serrulatum 320 mg UNO jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 4 Wochen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist eviprostat-S sabal serrulatum 320 mg UNO und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von eviprostat-S sabal serrulatum 320 mg UNO beachten?
3. Wie ist eviprostat-S sabal serrulatum 320 mg UNO einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist eviprostat-S sabal serrulatum 320 mg UNO aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist eviprostat-S sabal serrulatum 320 mg UNO und wofür wird es angewendet?

eviprostat-S sabal serrulatum 320 mg UNO ist ein pflanzliches Arzneimittel zur Besserung von Prostata-bedingten Beschwerden beim Wasserlassen. eviprostat-S sabal serrulatum 320 mg UNO wird angewendet gegen Beschwerden beim Wasserlassen bei einer gutartigen Vergrößerung der Prostata (Miktionsbeschwerden bei benigner Prostatahyperplasie im Stadium I bis II nach Alken bzw. II bis III nach Vahlensieck).

Hinweis: Eine Behandlung mit eviprostat-S sabal serrulatum 320 mg UNO sollte nur nach ärztlicher Diagnose erfolgen. Dieses Medikament bessert nur die Beschwerden bei einer vergrößerten Prostata, ohne die Vergrößerung zu beheben. Bitte suchen Sie daher in regelmäßigen Abständen Ihren Arzt auf. Insbesondere bei Blut im Urin, Harnwegsinfekt, Verschlimmerung der Beschwerden oder akuter Harnverhaltung sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von eviprostat-S sabal serrulatum 320 mg UNO beachten?

eviprostat-S sabal serrulatum 320 mg UNO darf nicht eingenommen werden

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Sägepalmenfrüchte-Dickextrakt oder einen der sonstigen Bestandteile von eviprostat-S sabal serrulatum 320 mg UNO sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von eviprostat-S sabal serrulatum 320 mg UNO ist erforderlich

- Wenn Sie gleichzeitig bestimmte andere Medikamente einnehmen. Beachten Sie deshalb bitte auch die Angaben unter Wechselwirkungen.
- Wenn Sie an einer Erkrankung leiden, bei der die Blutungsneigung verstärkt wird sowie vor chirurgischen oder zahnärztlichen Eingriffen, da eviprostat-S sabal serrulatum 320 mg UNO die Blutungsneigung erhöhen kann.

gischen oder zahnärztlichen Eingriffen, da eviprostat-S sabal serrulatum 320 mg UNO die Blutungsneigung erhöhen kann.

- Wenn Sie unter einem zu hohen Blutdruck leiden (da in klinischen Studien bei einzelnen Patienten ein erhöhter Blutdruck beschrieben wurde). Der Blutdruck sollte regelmäßig kontrolliert werden.
- Als Kontrolle vor und regelmäßig während der Behandlung mit eviprostat-S sabal serrulatum 320 mg UNO sollte eine ärztliche Untersuchung (auch zur Früherkennung eines Prostatakarzinoms) durchgeführt werden.

Bei Einnahme/Anwendung von eviprostat-S sabal serrulatum 320 mg UNO mit anderen Arzneimitteln Wechselwirkungen wurden bisher nicht ausreichend untersucht.

- Bei gleichzeitiger Einnahme dieses Arzneimittels mit bluterungshemmenden Arzneimitteln (wie z.B. Phenprocoumon, Warfarin, Clopidogrel, Acetylsalicylsäure und andere nichtsteroidale Antirheumatika) kann deren Wirkung verstärkt werden.
- Bei gleichzeitiger Einnahme dieses Arzneimittels mit Antandrogenen kann die Wirkung dieser Stoffe verstärkt werden; bei Einnahme therapeutischer Androgene kann deren Wirkung abgeschwächt werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von eviprostat-S sabal serrulatum 320 mg UNO zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

eviprostat-S sabal serrulatum 320 mg UNO hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

3. Wie ist eviprostat-S sabal serrulatum 320 mg UNO einzunehmen?

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt eviprostat-S sabal serrulatum 320 mg UNO nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die

Anweisungen in dieser Packungsbeilage, da eviprost-S sabal serrulatum 320 mg UNO sonst nicht richtig wirken kann.

Sie sollten **einmal** täglich **eine** Weichkapsel einnehmen (1 x 320 mg Sägepalmenfrüchte-Dickextrakt).

Kinder und Jugendliche:

Die Anwendung von eviprost-S sabal serrulatum 320 mg UNO ist für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht vorgesehen (wegen fehlender Indikation).

Nehmen Sie bitte die Weichkapsel unzerkaut mit reichlich Wasser jeweils zu einer festgelegten Mahlzeit ein. Über die Dauer der Behandlung entscheidet der behandelnde Arzt. Bitte beachten Sie die Angaben unter Anwendungsgebiete, Vorsichtsmaßnahmen und Wechselwirkungen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von eviprost-S sabal serrulatum 320 mg UNO zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge eviprost-S sabal serrulatum 320 mg UNO eingenommen haben, als Sie sollten

Setzen Sie die Einnahme gemäß Dosierungsanleitung fort. Vergiftungserscheinungen sind bisher nicht bekannt.

Wenn Sie die Einnahme von eviprost-S sabal serrulatum 320 mg UNO vergessen haben

Die Anwendung sollte ohne Dosisänderung fortgeführt werden (nicht die doppelte Menge nach einer vergessenen Einzeldosis einnehmen). Sie sollten die Anwendungsdauer einhalten, da sonst kein ausreichender Therapieerfolg gewährleistet ist.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch eviprost-S sabal serrulatum 320 mg UNO Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000

Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von eviprost-S sabal serrulatum 320 mg UNO auftreten?

- Gelegentlich treten Magen-Darm-Beschwerden (Übelkeit, Erbrechen, Magen- oder Bauchschmerzen oder Durchfall) auf. Gelegentlich kann es zur Erhöhung des Blutdrucks kommen.
- Allergische Reaktionen oder Überempfindlichkeitsreaktionen (Häufigkeit nicht bekannt).

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich

beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem BfArM – Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de – anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist eviprost-S sabal serrulatum 320 mg UNO aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und auf der Durchdrückpackung nach „Verwendbar bis“ angegebenem Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Nicht über 30 °C lagern.

Bitte bewahren Sie eviprost-S sabal serrulatum 320 mg UNO in der Originalverpackung auf, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.

6. Weitere Informationen

Was eviprost-S sabal serrulatum 320 mg UNO enthält

Der Wirkstoff ist:

320 mg Dickextrakt aus Sägepalmenfrüchten (9 – 11:1), Auszugsmittel: Ethanol 90% (V/V).

Die sonstigen Bestandteile sind:

Gelatinepolysuccinat, Glycerol 85 %, Farbstoff E 171, Farbstoff E 172.

Wie eviprost-S sabal serrulatum 320 mg UNO aussieht und Inhalt der Packung

eviprost-S sabal serrulatum 320 mg UNO ist eine ovale Weichkapsel, längsseitig zu gleichen Hälften gelb/braun.

eviprost-S sabal serrulatum 320 mg UNO ist in folgenden Packungsgrößen erhältlich:

Originalpackungen mit 60, 100, 120 oder 200 Weichkapseln zum Einnehmen;
Musterpackung mit 20 Weichkapseln zum Einnehmen.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutische Fabrik Evers GmbH & Co. KG
Siemensstraße 4 · 25421 Pinneberg
Tel.: +49-4101-73800

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2013.

