

EVIPROSTAT® N

Magensaftresistente Tabletten

Zur Anwendung bei erwachsenen Männern

1 magensaftresistente Tablette enthält:

Wirkstoffe:

Frisches Doldenblütiges Wintergrün-Kraut-Trochenextrakt
Frische Pappelblätter und frische Rinde junger Pappelzweige-Mischextrakt
Frische Kuhschellen-Ganzpflanze-Trochenextrakt
Schachtelhalmkraut-Trochenextrakt
Raffiniertes Weizenkeimöl

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Eviprost N jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 3 bis 4 Wochen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Eviprost N und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Eviprost N beachten?
3. Wie ist Eviprost N einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Eviprost N aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Eviprost N und wofür wird es angewendet?

Eviprost N ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das von älteren Männern angewendet wird zur Besserung von Beschwerden beim Wasserlassen bei gutartiger Vergrößerung der Prostata (Vorsteherdrüse).

Vor der Anwendung sind ernste Erkrankungen durch einen Arzt auszuschließen.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Eviprost N beachten?

Eviprost N darf nicht eingenommen werden, wenn Sie

- überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile (siehe Abschnitt 6) von Eviprost N sind.
- unter einer Leber- und/oder Nierenfunktionsstörung leiden.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Eviprost N ist erforderlich

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren.

Insbesondere bei Verschlechterung der Beschwerden, bei Fieber, Blut im Urin, Krämpfen, Schmerzen beim Wasserlassen und akuter Harnverhaltung ist ein Arzt aufzusuchen.

Kinder und Jugendliche

Aufgrund des Anwendungsgebietes ist eine Anwendung bei Kindern und Jugendlichen nicht vorgesehen.

Bei Einnahme von Eviprost N mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

Untersuchungen mit Eviprost N zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln liegen jedoch nicht vor.

Bei Einnahme von Eviprost N zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit Nahrungsmitteln oder Getränken bekannt geworden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Die Einnahme von Eviprost N ist nur für Männer angezeigt (vgl. das Anwendungsgebiet).

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Studien zum Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen wurden mit Eviprost N nicht durchgeführt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Eviprost N

Eviprost N enthält Saccharose, Lactose und Glucose. Bitte nehmen Sie Eviprost N erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie an einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Eviprost N enthält Natrium

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol (23mg) Natrium pro Dosiereinheit, d.h. es ist nahezu natriumfrei.

3. Wie ist Eviprost N einzunehmen?

Aufgrund des Anwendungsgebietes ist eine Anwendung bei Kindern, Jugendlichen und Frauen nicht vorgesehen.

Nehmen Sie Eviprost N immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein.

Sie sollten **dreimal täglich zwei** magensaftresistente Tabletten einnehmen.

Nehmen Sie die magensaftresistenten Tabletten bitte unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit (vorzugsweise ein Glas Trinkwasser) ein. Die Anwendungsdauer beträgt 3 bis 4 Wochen. Bestehen die Beschwerden weiter, ist ein Arzt aufzusuchen. Beachten Sie auch die Angaben unter „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Eviprostat N ist erforderlich“.

Personen, die an einer Nieren- oder Leberschädigung leiden:
Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei eingeschränkter Nierenfunktion/Leberfunktion gibt es keine hinreichenden Daten. Daher dürfen Sie Eviprostat N nicht einnehmen, wenn Sie an einer Leber- und/oder Nierenfunktionsstörung leiden.

Wenn Sie eine größere Menge Eviprostat N eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie versehentlich einmal die doppelte oder dreifache Einzeldosis eingenommen haben, so hat das in der Regel keine nachteiligen Folgen.

Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist.

Wenn Sie eine wesentlich größere Menge von Eviprostat N eingenommen haben als Sie sollten, benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden. Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

Wenn Sie die Einnahme von Eviprostat N vergessen haben

Die Anwendung sollte ohne Dosisänderung fortgeführt werden (nicht die doppelte Menge nach einer vergessenen Einzeldosis einnehmen).

Wenn Sie die Einnahme von Eviprostat N abbrechen

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch Eviprostat N Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es können leichte Magen-Darm-Beschwerden und Überempfindlichkeitsreaktionen wie Juckreiz und Hautausschlag auftreten. Die Häufigkeit, mit der diese Nebenwirkungen auftreten, ist nicht bekannt.

Bei auftretenden Nebenwirkungen ist das Präparat abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen. Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Eviprostat N nicht nochmals eingenommen werden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Eviprostat N aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Blister und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Eviprostat N sollte in der Originalverpackung aufbewahrt werden, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen. Nicht über 25 °C aufbewahren.

Entsorgungshinweis:

Entsorgen Sie das Arzneimittel nicht im Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. Weitere Informationen

Was Eviprostat N enthält

Die Wirkstoffe von Eviprostat N sind:

Eine magensaftresistente Tablette enthält:

Trockenextrakt aus frischem Doldenblütigen

Wintergrün-Kraut (9,7-23:1)

Auszugsmittel Ethanol 90 % (V/V) 0,0235 mg

Mischextrakt aus frischen Pappelblättern und

frischer Rinde junger Pappelzweige (1:1) (15-25:1)

Auszugsmittel Ethanol 90% (V/V) 0,025 mg

Trockenextrakt aus frischer Kuhschellen-

Ganzpflanze (18-36:1)

Auszugsmittel Ethanol 90% (V/V) 0,01 mg

Trockenextrakt aus Schachtelhalmkraut (5,6-6,3:1)

Auszugsmittel Ethanol 20% (V/V) 1,5 mg

Raffiniertes Weizenkeimöl 15 mg

Die sonstigen Bestandteile sind:

Titandioxid (E 171), Weißer Ton, Calciumcarbonat, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer-(1:1)-Dispersion 30% (Ph.Eur.), Arabisches Gummi, Macrogol 6000, Triethylcitrat, Lactose-Monohydrat, Saccharose, Cellulosepulver, Talkum, Hochdisperses Siliciumdioxid, mikrokristalline Cellulose, Maisstärke, Natriumstearyl fumarat (Ph.Eur.), Glucose-Monohydrat (Ph.Eur.), Gelatine, Palmitoylascorbinsäure (Ph.Eur.), Carnaubawachs.

Wie Eviprostat N aussieht und Inhalt der Packung:

Eviprostat N sind runde, weiße, glänzende, überzogene Tabletten, die in Packungen zu 100 und 200 magensaftresistenten Tabletten erhältlich sind.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Pharmazeutische Fabrik Evers GmbH & Co. KG
Siemensstraße 4 · 25421 Pinneberg
Tel.: 04101/738 00 · Fax: 04101/738 89
evco@pharmaevers.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2021.

