


Homöopathisches Arzneimittel

016145/5008 DE



ad us. vet.

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Für Tiere

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen

Zusammensetzung:

1 Ampulle zu 5 ml (= 5 g) enthält: Wirkstoffe: Atropinum sulfuricum Dil. D4 0,5 g, Cuprum aceticum Dil. D4 0,1 g, Citrullus colocynthis Dil. D4 0,1 g, Veratrum album Dil. D4 0,1 g, Acidum arsenicosum Dil. D6 0,1 g, Lytta vesicatoria Dil. D6 0,1 g, Bryonia Dil. D4 0,1 g. Gemeinsame Potenzierung der letzten zwei Stufen. Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 76532 Baden-Baden Telefon: 07221 501-00

Telefax: 07221 501-210 E-Mail: info@heel.de

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation:

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Wechselwirkungen:

Keine bekannt. Wenn Atropinum compositum ad us. vet. gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie Ihren Tierarzt.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt. Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen. Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier / Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierarten:

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze





Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, Atropinum compositum ad us. vet. subkutan injizieren. Entsprechend der Tierart beträgt die Einzeldosis pro Tag:

Pferd, Rind, Schwein: 5 ml

Ferkel: 2-3 ml Schaf, Ziege: 2 ml großer Hund: 3-4 ml mittlerer Hund: 2 ml kleiner Hund, Katze: 1-2 ml Welpen: 0,5-1 ml

Bei akuten Beschwerden kann die angeführte Dosis nach 6 Stunden einmal wiederholt werden.

Dauer der Behandlung

Hinweis: Das Präparat sollte ohne tierärztlichen Rat nicht über einen längeren Zeitraum angewendet werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die richtige Anwendung:

Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen. Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden. Eine Injektion dieses Arzneimittels sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen.

Wartezeit:

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege: Essbare Gewebe: O Tage; Pferd, Rind, Schaf, Ziege: Milch: O Tage.

Besondere Lagerungshinweise:

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf Behältnis und äußere Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich. Nach Anbruch sofort verbrauchen. Angebrochene Ampullen sind zu verwer-

Packungsgrößen:

Flüssige Verdünnung zur Injektion 5 und 50 Ampullen zu 5 ml

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr. 17757.00.00

Stand der Information:

Juni 2014



Farbiger Punkt nach oben!

Im Ampullenspieß befindliche Lösung durch Klopfen oder Schütteln nach unten fließen lassen.



Farbiger Punkt nach oben!

Ampullenspieß nach hinten ziehend abbrechen

Ampulle vorsichtig öffnen! Bitte befolgen Sie die Anweisungen.

