



Stibium Phcp® Salbe

Homöopathisches Arzneimittel

Phönix Laboratorium GmbH

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Stibium Phcp® Salbe und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Stibium Phcp® Salbe beachten?
3. Wie ist Stibium Phcp® Salbe anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Stibium Phcp® Salbe aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST STIBIUM PHCP® SALBE UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

Stibium Phcp® Salbe ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON STIBIUM PHCP® SALBE BEACHTEN?

Stibium Phcp® Salbe darf nicht angewendet werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Bestandteile von Stibium Phcp® Salbe sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Cetylstearylalkohol, Wollwachsalkohole und Butylhydroxytoluol (Bestandteile der Salbengrundlage) können örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen, Butylhydroxytoluol auch Reizungen der Augen und der Schleimhäute.
- Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten kontrolliert werden, da bei nicht indizierter Anwendung unerwünschte Arzneimittel-Prüfsymptome (neue Beschwerden) auftreten können. Beim Auftreten neuer Beschwerden soll das Arzneimittel abgesetzt werden.
- Sollten während der Anwendung des Arzneimittels die Krankheitssymptome fortauern, müssen Sie medizinischen Rat einholen.

Kinder

Wenden Sie Stibium Phcp® Salbe bei Kindern unter 12 Jahren nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten an, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für eine allgemeine Empfehlung für diese Altersgruppe vorliegen.

Anwendung von Stibium Phcp® Salbe zusammen mit anderen Arzneimitteln

Keine Wechselwirkungen bekannt. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Stibium Phcp® Salbe hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

3. WIE IST STIBIUM PHCP® SALBE ANZUWENDEN?

Stibium Phcp® Salbe ist eine Salbe zum Auftragen auf die Haut.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem homöopathisch erfahrenen Therapeuten oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Therapeuten oder Apotheker nach, wenn Sie sich bezüglich der Anwendung nicht sicher sind.

Dauer der Anwendung

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über 1 Woche ohne Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Stibium Phcp® Salbe angewendet haben, als Sie sollten

Es wurden diesbezüglich keine Fälle bekannt.

Wenn Sie die Anwendung von Stibium Phcp® Salbe vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Stibium Phcp® Salbe abbrechen

In diesem Fall wenden Sie sich an Ihren homöopathisch erfahrenen Therapeuten oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Anwender auftreten müssen. Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1 000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10 000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10 000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

In seltenen Fällen können bei Überempfindlichkeit gegen Bestandteile der Salbengrundlage (z.B. Cetylstearylalkohol, Wollwachsalkohole) allergische Hautreaktionen auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren homöopathisch erfahrenen Therapeuten befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST STIBIUM PHCP® SALBE AUFZUBEWAHREN?

- Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
- Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett bzw. Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.
- Nach Anbruch des Gefäßes 3 Monate haltbar.
- Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über 25° C aufbewahren.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Stibium Phcp® Salbe enthält

10 g Salbe enthalten:

Acidum silicicum Trit. D3 0,1 g, Stibium sulfuratum nigrum Dil. D8 0,1 g

Sonstige Bestandteile:

Wollwachsalkoholsalbe (DAB) (enthält: Cetylstearylalkohol, Wollwachsalkohole, Weißes Vaseline, Butylhydroxytoluol), Hydrophile Salbe (DAB) (enthält: Emulgierender Cetylsterylalkohol (Typ A), Dickflüssiges Paraffin, Weißes Vaseline)

Wie Stibium Phcp® Salbe aussieht und Inhalt der Packung

Stibium Phcp® Salbe ist eine durchscheinende weiß bis gelblich-weiße Salbe in Tuben mit Kunststoffverschluss.

Packungsgrößen: 30 g, 100 g

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 2517568.00.00

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Phönix Laboratorium GmbH, Benzstraße 10, D-71149 Bondorf

Tel.: 07457 - 95606-0, Fax: 07457 - 95606-50, Email: kontakt@phoenix-lab.de

Stand der Information

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im März 2022 überarbeitet.