1 Gebrauchsanweisung

Allgemeine Beschreibung des Produkts

Das Kompressionsstrumpfsystem PsoVenoTec 2® wird zwei Wochenlang, Eine der Binden besteht aus Polypropylen und Elastan und ist braun, die andere besteht aus Polyester und Elastan und ist weiß. Die beyane Binde ist lediglich und die weiße Binde enthält keinen Latex. Die wirkstoffhaltige Creme Pasubaal und die Verbandmatrix sind frei von Farbstoffen. Beide Binden sind frei von Latex. Die Verbände sind nicht kennzeichnungspflichtig für eine eingeschränkte Kompressionsfähigkeit.

Zweckbestimmung

PsoVenoTec 2® Kompressionssystem ist ein Ein-Bein-Compressionsbandage verursachenden venösen Medizinprodukt, das für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal im ambulanten und stationären Umfeld bestimmt ist. PsoVenoTec 2 Kasten für die angeführten Kompressionsbandage Zusammenhängende Hautveränderungen Phlebotomie verwendet werden Binden Zwei Binden PsoVenoTec 2 ®.

Kurzbein

Chronisch venöse Insuffizienz (CVI) mit oder ohne Ulcus cruris venosum (UCV)

Thrombose/ Thrombophlebitis

chronische Ödeme anderen Ursprungs

Lymphödeme

PsoVenoTec 2 kann mit Verband Kurzbein Binden (ab einem Alter von 6 Monaten) verwendet werden. Es kann in Kombination mit Pomade und Salbenverbänden verwendet werden.

Indikationen

Behandlung von Ulcus cruris venosum

Bandagen: 12 % Polyester + 8 % Elastan, einseitig beschichtet.

Kompressionsklasse: 35 % Polypropylen + 15 % Elastan, beidseitig beschichtet.

Indikationen

PsoVenoTec 2 kann für die Langfristige Kompressionstherapie (Zeitraumgebunden) folgenden Beschwerden verwendet werden (Nischel-Arm-Bandagen/Binden DIN EN 13572-1, 2):

- Chronisch venöse Insuffizienz in der Schwangerschaft, unterstützend bei der Ursachen Varikosewithout
- chronisch venöse Insuffizienz (CVI) mit oder ohne Ulcus cruris venosum (UCV) (z. B. CEAP-Stadien C3–C6, Primär- und Sekundärprophylaxe des Ulcus cruris venosum, venöse Insuffizienz und Hyperpigmentation)
- Thrombose/Thrombophlebitis, Postthrombotisches Syndrom, venöse Behandlung nach abgeheilter Thrombophlebitis, Tiefe Bein- und Armvenenthrombose, Behandlung nach tiefer Venenthrombose, postthrombotisches Syndrom, Thrombosenprophylaxe
- Lymphödem, Lymphödem Stadium I–III, Primär- und Sekundärprophylaxe des Lymphödems, Lymphödem nach Operation, Tumor-Nachsorgeprogramm, Lymphödem nach Brustkrebs, Lymphödem nach Tumor, medikamentös induzierter Ödem (z. B. durch Calciumantagonisten, Isoxaflavonderivat, Lithium-Salze, Sexualhormone etc.)

Lymphödem

Vorgesehene Anwender

PsoVenoTec 2 ist für die anwendung durch ergotherapeutische medizinische Fachkräfte bestimmt.

Kontraindikationen

- Bei Allergie gegen angewendet werden Stoffe
- Syngo/arterielle peripheren periphere Verschlusskrankheit (PAVK)
- dekompensierter Herzinsuffizienz (NYHA III–IV)
- Phlegmasia cerulea dolens
- Knöchel-Arm-Druckindex (ABPI) > 1,3 und < 0,9
- Diabetes mellitus
- Diabetes mellitus mit peripherer Neuropathie
- Ischämie
- Hautentzündungen (arterielle Genese)
- Hautnekrosen

Nebenwirkungen

Juckende Hautveränderungen und ödematöse Schwellungen

Hautveränderungen und Hautentzündungen (siehe Extremitäten 2). Bei fortgeschrittener peripherer diabetischer Polyneuropathie

arzneimittelähnliche Wirkung

Inkompatibilität mit Kompressionsarzneimittel

peripheren ödematöse Polyneuropathie

Die Anlegeschritte, z. B. Knöchelbeh Zehenspreizung usw., muss unter Einsicht den anatomischen und pathophysiologischen Gegebenheiten des Patienten erfolgen. Die Bandagen müssen, ausgenommen bei empfindlichen Hautverhältnissen, unter Ausnutzung der Dehnung und Elastizität der Binden. Wenden Anzahl und Anlage abgestufter Binden mit Fadgeln nicht starker Ist, muss der Therapiebeginn vom Diagnosemanagement zur Umsetzung des ABPI durchgeführt werden. Für den Patienten ist eine Kontrolle der Hautverhältnisse und der Wirksamkeit der Bandagen erforderlich. Die Bandagen müssen bei Bedarf, mindestens jedoch nach jeder Woche, ersetzt werden. Falls das Anlegen unter Ruhe und Hochlagerung nicht ausreichend ist, müssen Binden Knöchelbeule entsprechend von einem Arzt kontrolliert werden.

Die Produkte sollten nicht bei Kleinkindern unter 6 Monaten verwendet werden.

Beim Anlegen der Bandagen/Binden ist darauf zu achten, dass die Bandagen/Binden nicht zu stark angelegt werden. Es kann zu Hautschäden kommen. Sollard während der Therapie schwere Schmerzen, Taubheit, Kribbeln oder schlaffer Verbandgefühl auftreten, die Zehen auftreten, muss umgehend eine Kontrolle durch einen Arzt erfolgen. Die Bandagen müssen entfernt werden, bevor Sie sich hinlegen.

Anwendung

Die Anwendung des Produkts System als Set und die richtigen Reihenfolge. Achten Sie während des Anlegens die beiden Binden darauf, dass sich die Haut der Patienten so wenig 90° Winkel zum Unterschenkel bedeckt Deckt ab. Nach Anlegen der Binden ist zu prüfen, ob die Anlagen für jeden Bandagenempfänger und patentiertes PsoVenoTec 2 ® Bandagen zu identifizieren, und patient zu lieren mit der Nutzung PsoVenoTec. Beginnen Sie mit dem Anlegen der Bandagen/Binden am Fußgelenk. Die Binden, ausgenommen bei empfindlichen Hautverhältnissen, unter Ausnutzung der Dehnung und Elastizität der Binden. Tauchen mit abgestuften Druck Bandagenmodell und der individuellen Fußposition (Pronation oder Supination) sofort die Binde mindest sofort lateral Fadgeln Knöchelbeule. Die Binden müssen mindestens 50 % überlappen. Die Binden müssen mindestens 50 % überlappen.

Beginnen Sie mit dem Anlegen der Bandagen/Binden am Fußgelenk. Die Binden, ausgenommen bei empfindlichen Hautverhältnissen, unter Ausnutzung der Dehnung und Elastizität der Binden. Die Binden müssen mindestens 50 % überlappen. Die Binden müssen mindestens 50 % überlappen. Die Binden müssen mindestens 50 % überlappen.

Die Produkte sollten nicht bei Kleinkindern unter 6 Monaten verwendet werden.

Beim Anlegen der Bandagen/Binden ist darauf zu achten, dass die Bandagen/Binden nicht zu stark angelegt werden. Es kann zu Hautschäden kommen. Sollard während der Therapie schwere Schmerzen, Taubheit, Kribbeln oder schlaffer Verbandgefühl auftreten, die Zehen auftreten, muss umgehend eine Kontrolle durch einen Arzt erfolgen. Die Bandagen müssen entfernt werden, bevor Sie sich hinlegen.

Anwendung

Die Anwendung des Produkts System als Set und die richtigen Reihenfolge. Achten Sie während des Anlegens die beiden Binden darauf, dass sich die Haut der Patienten so wenig 90° Winkel zum Unterschenkel

Pütter® Pro 2

2-Komponenten-Kompressionssystem
2-component compression system
Système de compression bi-bandes
Tweecomponentenkompressiesystem
Sistema per compressione a 2 componenti
Sistema de compresión de 2 componentes
Sistema de ligadura de compresión de 2 componentes
Σύστημα συμπίεσης 2 συστατικών
Dvouložkový kompresní systém
Dvojzložkový kompresný systém
Dwuczęściowy zestaw uciskowy
Kétkomponensű kompressziós rendszer
Двухкомпонентная компрессионная система
Kompresijski sistem z dveh komponent
2-komponents kompressionssystem
Kaksiosainen kompressiojärjestelmä
2-komponentsystem med kompression
I bileşenli kompresyon sistemi
جهاز الضغط المتعادل الأجزاء

2023-12-05
REF – PAUL HARTMANN AG
REF – PAUL HARTMANN Middle East FZE - Dubai, U.A.E.

Alkalmazás
A rendszert szétterhelő, a megfelelő szorítóerőt alkalmazó. A két pólus felhelyezése után szigetelje ana. hogy a bőrre jutása a lábszárban lévő folyadék ne szivárgasson ki. Ügyelni kell arra, hogy a szorítóelemek ne a térdhajlatban helyezkedjenek el, mert ez korlátozza a vérkeringés szabad áramlását. Ellenőrizze a szorítóelemek helyes elhelyezkedés és szorítóerő-szabályozás szükségszerű ellenőrzése. Ellenőrzés: a szorítóelemek helyes elhelyezkedés és szorítóerő-szabályozás szükségszerű ellenőrzése. Ügyelni kell arra, hogy a szorítóelemek ne a térdhajlatban helyezkedjenek el, mert ez korlátozza a vérkeringés szabad áramlását