


Mundgel aldiamed

Speichelergänzung



angenehme Frische - statt trockener Mund

 Bitte Gebrauchsinformation aufmerksam lesen

Anwendungsgebiet:

Mundatmung (bei Erkältung oder Schnarchen) verringert sein.

aldiamed Mundgel ist ein lang anhaltendes Feuchtigkeitsgel zur Behandlung bei Mundtrockenheit (Xerostomia).

Die Rolle des Speichels:

Der Speichel des Menschen ist der natürliche Schutz der Zähne und des Zahnfleisches. Er enthält verschiedene Enzyme, die im Mundraum gegen Mikroorganismen wirken.

Wirkweise:

aldiamed Mundgel verleiht eine für Stunden andauernde, **angenehme Befeuchtung** im Mund. Es **beugt Entzündungen im Mundraum vor**.

Ein trockener Mund kann sehr unangenehm sein und erschwert das Sprechen, Kauen und Schlucken. Zudem können aufgrund des verminderten Speichels bakteriell verursachte Entzündungen, Zahnprobleme (z. B. Karies, Parodontose) und Infektionen entstehen. Speichelmangel ist eine der Hauptursachen für die erhöhte Bildung von Plaque, Mundgeruch und Zahnfleischentzündungen.

Die angenehm dickflüssige Konsistenz sorgt dafür, dass sich das Mundgel lang anhaltend wie ein Schutzfilm auf die Mundschleimhaut legt und diese **auch nachts sehr gut vor dem Austrocknen schützt**.

Ursachen der Mundtrockenheit:

Die Intensität der Speichelproduktion ist von Mensch zu Mensch verschieden ausgeprägt und nimmt mit zunehmendem Alter meist ab.

Deshalb enthält alichiamed Mundgel den Speichelbestandteil Lactoferrin (Enzym), welcher hilft, schädliche Bakterien zu bekämpfen.

Sie ist Schwankungen unterworfen, die z. B. auf einen starken Flüssigkeitsmangel zurückzuführen sind (ungenügendes Trinken). Zudem kann der Speichel durch Erkrankungen wie Diabetes Mellitus oder Sjögren-Syndrom, Strahlentherapien, Medikamentennebenwirkungen, verminderte Kau- und Sprechfähigkeit, Stress, psychische Probleme, Rauchen sowie

Anwendung:

- so oft wie erforderlich
- nach dem Zähneputzen
- nach dem Mundspülen, z. B. mit der alichiamed Mundspülung
- und ganz besonders abends vor dem Zubettgehen

Sie können aldiamed Mundgel mit einem sauberen Finger oder einem Wattestäbchen unmittelbar auf das Zahnfleisch oder die besonders trockenen Bereiche im Mund auftragen.

Um Ihre Mundhöhle komplett zu benetzen, können Sie auch 1 - 2 cm aldiamed Mundgel auf die Zunge legen und gleichmäßig mit der Zunge im Mundraum verteilen.

Hinweise:

Der Zeitraum der Befeuchtung hängt von subjektiven Faktoren ab. Geringer Restspeichelfluss kann genau wie Essen, Trinken, Kaugummi kauen oder Zähneputzen das Gel schneller aus dem Mund spülen. Für eine langanhaltende Wirkung empfehlen wir, das Gel nach dem Essen und Trinken aufzutragen.

aldiamed Mundgel ist auch für Diabetiker und für Träger von Zahnprothesen geeignet.

Wirkstoffe: Glycerin, Sorbitol, Xylitol, Aloe Vera, Polyacrylat, Xanthan, Lactoferrin.

Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Nicht auf versehrter Mundschleimhaut anwenden.

Neben-/Wechselwirkungen: Bei Überdosierung (mehr als eine Tube täglich) ist eine abführende Wirkung möglich.

Weitere aldiamed-Produkte:

Insbesondere bei trockenem Mund ist eine gute Mundhygiene äußerst wichtig. Dazu gehört auch die regelmäßige Anwendung einer Mundspülung. Bei trockenem Mund sollte diese keine

reizenden Inhaltsstoffe wie Alkohol oder Menthol enthalten.

aldiamed Mundspülung erfüllt diese Vorgaben. Sie reinigt, pflegt und schützt Zähne und Mundschleimhaut sehr gut. Dank der leicht dickflüssigen Konsistenz befeuchtet sie den Mund angenehm.


Zur Befeuchtung und Pflege des trockenen Mundes für unterwegs und zwischendurch empfehlen wir **aldiamed Mundspray**.

Packungsgrößen aldiamed-Produkte:


Mundgel: 50 g / 40 ml
PZN (D): 00879268
PZN (AT): 3888517



Mundspülung: 250 ml
PZN (D): 00879239
PZN (AT): 3888523



Mundspray: 50 ml
PZN (D): 09397022
PZN (AT): 3887021



 Certmedica International GmbH
Magnolienweg 17, D-63741 Aschaffenburg

Haben Sie noch Fragen oder Anregungen? Tel.: +49 60 21 / 15 09 3 - 380

www.aldiamed.de

Stand der Information: 2014-09



Verfallsdatum beachten



Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate

