



PAZ00637GSX_618224

CAPSTAR™ 11,4 mg

921846

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers und, wenn unterschiedlich des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist

Zulassungsinhaber: Elanco Europe Ltd., Lilly House, Priestley Road, Basingstoke RG24 9NL, UNITED KINGDOM
Hersteller, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist: Novartis Santé Animale S.A.S., Usine de Huingue 26, rue de la Chapelle, 68332 Huinge Cedex, Frankreich

Bezeichnung des Tierarzneimittels

CAPSTAR™ 11,4 mg, Tabletten für Katzen und kleine Hunde, Nitenpyram

Wirkstoffe und sonstige Bestandteile

Eine Tablette enthält: Wirkstoff: Nitenpyram 11,4 mg

Anwendungsgebiet

Behandlung von Flohbefall (*C. felis*) bei Katzen und Hunden.

Gegenanzeigen

Keine bekannt.

Nebenwirkungen

In der ersten Stunde nach der Verabreichung von CAPSTAR™ kann beim Haustier unter Umständen verstärkter Juckreiz auftreten. Dieser Effekt wird von den Flöhen verursacht, die auf das Arzneimittel reagieren. In sehr seltenen Fällen zeigt sich dies bei Katzen durch vorübergehende Hyperaktivität. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierarten

Katze und Hund.

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Die minimale effektive Dosis von CAPSTAR™ beträgt 1 mg/kg Körpergewicht mit den folgenden Empfehlungen:
Wenn ein Flohbefall festgestellt wird, sollten Katzen und Hunde mit einem Körpergewicht zwischen 1 kg und 11,0 kg 1 Tablette CAPSTAR™ 11,4 mg erhalten. Die Behandlungshäufigkeit hängt vom Befallsgrad ab. Bei schwerem Flohbefall kann es erforderlich sein, die Tiere jeden Tag oder jeden zweiten Tag zu behandeln, bis der Flohbefall unter Kontrolle ist. Die Behandlung kann wieder aufgenommen werden, wenn erneut Flöhe auftreten. Es sollte nicht mehr als eine Behandlung pro Tag erfolgen.
CAPSTAR™ besitzt keine Langzeitwirkung. Um einen erneuten Befall zu vermeiden, wird eine geeignete Behandlung zur Kontrolle unreifer Stadien des Floh-Lebenszyklus empfohlen. Der behandelnde Tierarzt sollte ein geeignetes Behandlungsprogramm festlegen.

Hinweise für die richtige Anwendung

Ein Flohbefall kann durch Teilung des Fells und Untersuchung der Haut sowie durch Kämmen mit einem feinen Metallkamm erkannt werden.
Tabletten zur oralen Einnahme, mit oder ohne Futter. Um die Verabreichung hinsichtlich der geschmacklichen Akzeptanz zu erleichtern, können die Tabletten unmittelbar vor Verabreichung mit einer kleinen Menge Futter umhüllt werden.

Wartezeit

Nicht zutreffend.





Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.
Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr anwenden.
Nicht über 25°C aufbewahren.

Besondere Warnhinweise

Nicht bei Tieren anwenden, die jünger als 4 Wochen sind oder weniger als 1 kg wiegen, da diese Tiergruppen nicht untersucht wurden.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation

Nitenpyram kann während Trächtigkeit und Laktation verabreicht werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterial sofern erforderlich

Deutschland:
Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass hierbei kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

Österreich:
Abgelaufene oder nicht vollständig entleerte Packungen sind als gefährlicher Abfall zu behandeln und gemäß den geltenden Vorschriften einer unschädlichen Beseitigung zuzuführen. Leere Packungen sind mit dem Hausmüll zu entsorgen.

Genehmigungsdatum der Packungsbeilage

Januar 2016

Weitere Angaben

Wirkungen auf Flöhe (*Ctenocephalides felis*) können bereits 15 bis 30 Minuten nach Verabreichung des Produktes an das Wirtstier beobachtet werden. 95 % bis 100 % Wirksamkeit wird innerhalb der ersten 6 Stunden beobachtet. Innerhalb von 24 Stunden wird 100 % Wirksamkeit ohne Restaktivität erreicht.
Nitenpyram wird von den Zieltierarten gut vertragen. Überdosierungen bis zu 50 mg/kg bei Katzen und bis zu 70 mg/kg bei Hunden verliefen symptomlos.

Packungsgrößen:
Faltschachtel mit 1 Tablette
Faltschachtel mit 6 Tabletten
Faltschachtel mit 60 Tabletten
Evtl. sind nicht alle Packungsgrößen im Vertrieb.

Deutschland: Apothekenpflichtig, Zul.-Nr.: 400584.00.00
Österreich: Rezept- und apothekenpflichtig, Z. Nr.: 8-00538

Elanco, Capstar und der diagonale Balken sind Markenzeichen im Eigentum oder unter Lizenz von Eli Lilly and Company, ihren Tochtergesellschaften oder Niederlassungen.

