



## Schleimlöser 30 mg Tabletten

Wirkstoff: Ambroxolhydrochlorid

Für Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und Erwachsene.

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Sie **WICK Schleimlöser 30 mg** jedoch vorschriftsgemäß anwenden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 4–5 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie

Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist **WICK Schleimlöser 30 mg** und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von **WICK Schleimlöser 30 mg** beachten?
3. Wie ist **WICK Schleimlöser 30 mg** einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **WICK Schleimlöser 30 mg** aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### 1. WAS IST WICK SCHLEIMLÖSER 30 mg UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

**WICK Schleimlöser 30 mg** ist ein Arzneimittel zur Schleimlösung bei Atemwegserkrankungen mit zähem Schleim (Expektorans). **WICK Schleimlöser 30 mg** wird angewendet zur schleimlösenden Behandlung bei akuten und chronischen Erkrankungen der Bronchien und der Lunge mit zähem Schleim.

### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON WICK SCHLEIMLÖSER 30 mg BEACHTEN?

Sie dürfen **WICK Schleimlöser 30 mg** nicht einnehmen,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Ambroxol oder einen der sonstigen Bestandteile von **WICK Schleimlöser 30 mg** sind.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von WICK Schleimlöser 30 mg ist erforderlich**

- wenn Sie an einer eingeschränkten

der verflüssigte Schleim eventuell nicht mehr ausreichend abgehustet werden. Fragen Sie daher vor einer kombinierten Anwendung unbedingt Ihren Arzt.

### Schwangerschaft und Stillzeit

Bisher liegen keine ausreichenden Erfahrungen am Menschen vor. Sie sollten **WICK Schleimlöser 30 mg** daher während der Schwangerschaft, insbesondere während des ersten Drittels, und während der Stillzeit nur nach Anordnung Ihres Arztes und nur nachdem dieser eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung vorgenommen hat, einnehmen.

### Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von WICK Schleimlöser 30 mg

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie **WICK Schleimlöser 30 mg** daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

### 3. WIE IST WICK SCHLEIMLÖSER 30 mg





Nierenfunktion oder einer schweren Lebererkrankung leiden. Sie dürfen **WICK Schleimlöser 30 mg** dann nur in größeren zeitlichen Abständen oder verminderter Dosis einnehmen.

- wenn Sie an einer seltenen Erkrankung der Bronchien, die mit übermäßiger Sekretansammlung einhergeht (z. B. malignes Zilien-Syndrom), leiden. Wegen eines möglichen Sekretstaus sollten Sie **WICK Schleimlöser 30 mg** in diesem Fall nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt einnehmen.
- **WICK Schleimlöser 30 mg** ist aufgrund des hohen Wirkstoffgehaltes nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren. Hierfür stehen Arzneimittel in Form von Lösung mit geringerem Wirkstoffgehalt zur Verfügung.
- Sehr selten ist über das Auftreten von schweren Hautreaktionen wie Stevens-Johnson-Syndrom und Lyell-Syndrom in zeitlichem Zusammenhang mit der Anwendung von Ambroxol berichtet worden. Bei Neuauftreten von Haut- und Schleimhautveränderungen sollte daher unverzüglich ärztlicher Rat eingeholt und die Anwendung von **WICK Schleimlöser 30 mg** beendet werden.

#### **Bei Einnahme von WICK Schleimlöser 30 mg mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wenn Sie **WICK Schleimlöser 30 mg** in Kombination mit hustenstillenden Mitteln (Antitussiva) einnehmen, kann

#### **EINZUNEHMEN?**

**WICK Schleimlöser 30 mg** wird nach der Mahlzeit unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit (z. B. 1 Glas Wasser) eingenommen.

Hinweis:

Die schleimlösende Wirkung von **WICK Schleimlöser 30 mg** wird durch Flüssigkeitszufuhr verbessert.

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt **WICK Schleimlöser 30 mg** nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da **WICK Schleimlöser 30 mg** sonst nicht richtig wirken kann. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, fragen Sie bitte bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach.

#### **Kinder von 6–12 Jahren**

nehmen im Allgemeinen 2- bis 3-mal täglich je ½ Tablette ein (entsprechend 30–45 mg Ambroxolhydrochlorid/Tag).

#### **Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren**

nehmen im Allgemeinen während der ersten 2–3 Tage 3-mal täglich je 1 Tablette ein (entsprechend 90 mg Ambroxolhydrochlorid/Tag), danach 2-mal täglich je 1 Tablette (entsprechend 60 mg Ambroxolhydrochlorid/Tag).

Bei der Erwachsenen dosierung ist eine Steigerung der Wirksamkeit gegebenenfalls durch die Gabe von 2-mal täglich 60 mg Ambroxolhydrochlorid (entspricht 120 mg Ambroxolhydrochlorid pro Tag) möglich.

Hinweis:

Wenn Sie an einer eingeschränkten Nierenfunktion oder einer schweren Lebererkrankung leiden, müssen Sie die Einnahmeabstände von **WICK Schleimlöser 30 mg** vergrößern oder die Dosis vermindern.

#### Wie lange sollten Sie WICK Schleimlöser 30 mg einnehmen?

Nehmen Sie **WICK Schleimlöser 30 mg** ohne ärztlichen Rat nicht länger als 4–5 Tage ein. Wenn nach dieser Zeit keine Besserung eintritt oder sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

#### Wenn Sie eine größere Menge WICK Schleimlöser 30 mg eingenommen haben, als Sie sollten

Schwerwiegende Vergiftungserscheinungen sind bei Überdosierung von Ambroxol nicht beobachtet worden. Es wurde über kurzzeitige Unruhe und Durchfall berichtet. Bei versehentlicher oder beabsichtigter extremer Überdosierung können vermehrte Speichelsekretion, Würgereiz, Erbrechen und Blutdruckabfall auftreten. Falls Sie **WICK Schleimlöser 30 mg** in zu großen Mengen eingenommen haben, setzen Sie sich bitte mit einem Arzt in Verbindung. Akutmaßnahmen, wie Auslösen von Erbrechen und Magenspülung, sind nicht generell angezeigt und nur bei extremer Überdosierung zu erwägen. Empfohlen wird eine Behandlung entsprechend den auftretenden Erscheinungen der Überdosierung.

#### Wenn Sie die Einnahme von WICK Schleimlöser 30 mg vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein. Wenn Sie einmal vergessen haben, **WICK Schleimlöser 30 mg** einzunehmen, oder zu wenig eingenommen haben, setzen Sie bitte beim nächsten Mal die Einnahme von **WICK Schleimlöser 30 mg** wie in der Dosierungsanleitung beschrieben fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann **WICK**

erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden kann.

#### 5. WIE IST WICK SCHLEIMLÖSER 30 mg AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

#### 6. WEITERE INFORMATIONEN

##### Was WICK Schleimlöser 30 mg enthält

Der Wirkstoff ist Ambroxolhydrochlorid.

Jede Tablette enthält 30 mg Ambroxolhydrochlorid.

Die sonstigen Bestandteile sind: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Maisstärke, Hochdisperses Siliciumdioxid.

##### Inhalt der Packung

Packung mit 20 Tabletten

##### Pharmazeutischer Unternehmer

WICK Pharma  
Zweigniederlassung der  
Procter & Gamble GmbH  
D-65823 Schwalbach

##### Hersteller

Merckle GmbH  
Ludwig-Merckle-Str. 3  
89143 Blaubeuren

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im September 2012**

**Schleimlöser 30 mg Nebenwirkungen**  
haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

<b>sehr häufig</b>	mehr als 1 von 10 Behandelten
<b>häufig</b>	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
<b>gelegentlich</b>	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1.000 Behandelten
<b>selten</b>	weniger als 1 von 1.000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
<b>sehr selten</b>	weniger als 1 von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle

**Störungen des Immunsystems**

Gelegentlich: Überempfindlichkeitsreaktionen (allergische Reaktionen), z. B. Hautausschlag, Gesichtsschwellungen, Atemnot, Juckreiz, Fieber

Sehr selten: schwere allergische (anaphylaktische) Reaktionen bis hin zum Schock

**Störungen des Magen-Darm-Trakts**

Gelegentlich: Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf **WICK Schleimlöser 30 mg** nicht nochmals eingenommen werden. Informieren Sie Ihren Arzt, damit dieser über den Schweregrad und gegebenenfalls

H25283

N221618.01