

# Sanum

## Notakehl® D3 Salbe



Darreichungsform:	Salbe zum Einreiben
Präparatgruppe:	Pilzpräparat
Wirkstoff:	Penicillium chrysogenum e volumine mycelii (lyophil., steril.) Dil. D3
Zusammensetzung:	1 g Salbe enthält: Wirkstoff: 0,10 g Penicillium chrysogenum e volumine mycelii (lyophil., steril.) Dil. D3 (HAB, Vorschrift 5a, mit gereinigtem Wasser). Sonstige Bestandteile: Wollwachsalkoholsalbe, Mittelkettige Triglyceride, Glycerolmonostearat 40-55, Propylenglycol, Magnesiumsulfat-Heptahydrat, Milchsäure, gereinigtes Wasser.
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	1–3x täglich dünn auf die betroffenen Hautpartien auftragen. Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte Notakehl® D3 abgesetzt werden.
Nebenwirkungen:	Aufgrund des Gehaltes von Notakehl® D3 an spezifischen organischen Bestandteilen können Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten und eine Allergie gegen den Bestandteil Penicillium chrysogenum ausgelöst werden. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.
Gegenanzeigen:	Nicht anwenden bei:

- bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (Penicillium chrysogenum)
- Autoimmunerkrankungen
- Kindern unter 12 Jahren
- Schwangerschaft und Stillzeit

---

Unerwünschte Reaktionen:

---

Wechselwirkungen: Immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die Wirksamkeit von Notakehl® D3 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.

---

Vorsichtsmaßnahmen: Keine bekannt.  
Cetylstearylalcohol und Wollwachs (Bestandteile der Wollwachsalkoholsalbe) können örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.

---

Hinweis:

---

Zusatzhinweis:

---

Dauer der Behandlung:

---

Handelsform: 30 g Tube PZN 03685748, 10x 30 g Bündelpackung PZN 03685754.

---

Stand vom: 02/2016