

Sanum

Quentakehl® D3 Zäpfchen



Darreichungsform:	Zäpfchen zur rektalen Anwendung
Präparatgruppe:	Pilzpräparat
Wirkstoff:	Penicillium glabrum e volumine mycelii (lyophil., steril.) D3
Zusammensetzung:	1 Zäpfchen enthält: Wirkstoff: 0,2 g Penicillium glabrum e volumine mycelii (lyophil., steril.) Trit. D3 (HAB, Vorschrift 6). Sonstiger Bestandteil: Hartfett.
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren führen 1x täglich 1 Zäpfchen vor dem Schlafengehen in den After ein. Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte Quentakehl® D3 abgesetzt werden.
Nebenwirkungen:	Aufgrund des Gehaltes von Quentakehl® D3 an spezifischen organischen Bestandteilen können Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten und eine Allergie gegen den Bestandteil Penicillium glabrum ausgelöst werden. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.
Gegenanzeigen:	Nicht anwenden bei: <ul style="list-style-type: none">• bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (Penicillium glabrum)• Autoimmunerkrankungen• Kindern unter 12 Jahren• Schwangerschaft und Stillzeit

Unerwünschte Reaktionen:

Wechselwirkungen: Immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die Wirksamkeit von Quentakehl® D3 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.

Vorsichtsmaßnahmen: Keine bekannt.

Hinweis: Enthält Lactose.

Zusatzhinweis:

Dauer der Behandlung:

Handelsform: Packung mit 10 Zäpfchen PZN 04457050,
Bündelpackung mit 10x 10 Zäpfchen PZN 04457067.

Stand vom: 03/2013