



Gebrauchsinformation: Information für den Anwender



Tabletten

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, Therapeuten oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Therapeuten oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach Anwendung dieses Arzneimittels nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

**Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Nisyslen® und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Nisyslen® beachten?
3. Wie ist Nisyslen® anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Nisyslen® aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

**1. Was ist Nisyslen® und wofür wird es angewendet?**

Nisyslen® ist ein homöopathisches Arzneimittel bei fieberhaften Erkältungskrankheiten.

Die Anwendungsgebiete von Nisyslen® leiten sich aus den Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Fieberhafte Erkältungskrankheiten, wie z.B. grippaler Infekt.

**2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Nisyslen® beachten?**

**Nisyslen® darf nicht angewendet werden:**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Eupatorium perfoliatum (Wasserdost), andere Korbblütler, einen der Wirkstoffe, Weizenstärke oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile von Nisyslen® sind.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Nisyslen® ist erforderlich:**  
Bei Fieber, das länger als 3 Tage bestehen bleibt oder über 39 °C ansteigt, sowie bei allen unklaren oder anhaltenden Beschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen, da es sich um eine Erkrankung handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedarf.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Säuglingen liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 1 Jahr nicht angewendet werden.

**Bei Anwendung von Nisyslen® mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Eine Beeinflussung der Wirkung von Nisyslen® durch andere Arzneimittel ist bisher nicht bekannt.

**Bei Anwendung von Nisyslen® zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Nisyslen®**

Dieses Arzneimittel enthält Lactose (Milchzucker). Bitte nehmen Sie es daher erst nach Rücksprache mit dem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Weizenstärke kann geringe Mengen Gluten enthalten, die aber auch für Patienten, die an Zöliakie leiden, als verträglich gelten.

**3. Wie ist Nisyslen® anzuwenden?**

Falls nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Bei akuten Beschwerden sollten Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren halbstündlich bis stündlich je 1 Tablette (höchstens 6-mal täglich) einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende häufige Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei abklingenden Beschwerden sollten Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme weiter zu reduzieren.





Kinder von 1 bis unter 6 Jahren erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder von 6 bis unter 12 Jahren erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenendosis. Sie sollten die Tablette eine halbe Stunde vor oder nach dem Essen einnehmen und sie vorzugsweise langsam im Mund zergehen lassen. Bei kleinen Kindern empfiehlt es sich, die Tablette vor der Einnahme in etwas Wasser aufzulösen.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

**Wenn Sie eine größere Menge Nisylen® angewendet haben, als Sie sollten**  
Es sind bisher keine schädlichen Wirkungen von Überdosierungen bekannt. Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt halten.

**Wenn Sie die Anwendung von Nisylen® vergessen haben**  
Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

**Wenn Sie die Anwendung von Nisylen® abbrechen**  
Es sind keine schädlichen Auswirkungen zu erwarten, wenn Sie die Anwendung von Nisylen® abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann Nisylen® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In seltenen Fällen kann es, z. B. aufgrund der Weizenstärke, zu Überempfindlichkeitsreaktionen wie Magen-Darm-Beschwerden oder allergischen Reaktionen kommen.

**Hinweis:** Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. Wie ist Nisylen® aufzubewahren?**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden.

#### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

##### **Was Nisylen® enthält**

*Die Wirkstoffe:* Aconitum Trit. D3 25 mg, Gelsemium Trit. D3 25 mg, Ipecacuanha Trit. D3 25 mg, Phosphorus Trit. D5 25 mg, Bryonia Trit. D2 25 mg, Eupatorium perfoliatum Trit. D1 25 mg

sind in 1 Tablette verarbeitet.

*Die sonstigen Bestandteile sind:* Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Weizenstärke.

##### **Wie Nisylen® aussieht und Inhalt der Packung**

Nisylen® ist eine weißliche, gelegentlich leicht gefleckte Tablette zum Einnehmen.

Packung mit 60 Tabletten

##### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Ottostraße 24, 76227 Karlsruhe  
[info@dhu.de](mailto:info@dhu.de)

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 37099.00.00

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2015.**

Nisylen® enthält sechs bewährte homöopathische Einzelmittel, die sich gut eignen zur Behandlung akuter fieberhafter Erkältungskrankheiten, wie z. B. grippaler Infekt, die plötzlich beginnen und sich rasch verstärken. Aconitum wird vor allem in der ersten Phase von akuten Infektionen des gesamten Nasen-Rachen-Raumes und der Bronchien eingesetzt, auch wenn diese in Verbindung mit Fieber auftreten. Bryonia beeinflusst neben dem Schnupfen besonders die trockene Bronchitis mit schmerzhaftem Reizhusten. Ipecacuanha ermöglicht die Verflüssigung des Bronchialsekrets und erleichtert so das Abhusten des oft zähen Schleimes. Gelsemium hat sich hauptsächlich bewährt bei akutem Schnupfen und bei Nebenhöhlenentzündung mit Abgeschlagenheit, Kopf- und Gliederschmerzen sowie bei Hals- und Kehlkopfentzündung. Dem Phosphor wird ein positiver Einfluss insbesondere bei Erschöpfungszuständen sowie bei Nerven- und Kopfschmerzen im Verlauf von akuten und chronischen Katarrhen der Luftwege zugeschrieben. Die Kombination wird schließlich durch Eupatorium perfoliatum, eines der zuverlässigsten Grippemittel in der Homöopathie, ergänzt, das sich vor allem bei Grippe, fieberhaften Erkältungskrankheiten sowie akutem Schnupfen bewährt hat. Durch das breitgefächerte Wirkungsspektrum von Nisylen® lassen sich die vielfältigen Beschwerden bei fieberhaften Erkältungskrankheiten bereits im Anfangsstadium wirkungsvoll beeinflussen.

