Wirksamkeit und Verträglichkeit zum fairen Preis

Infecto-Diarrstop® LGG®		
PZN 03436726	6 Beutel	**14,49 €**
Infecto-Diarrstop® LGG® Kirsch		
PZN 06705902	6 Beutel	**14,49 €**
Infecto-Diarrstop® LGG® Banane		
PZN 06705902	6 Beutel	**14,49 €**
Infecto-Diarrstop® LGG® Mono Beutel		
PZN 06872385	10 Beutel	**13,49 €**

Hinweis:

Verordnen Sie Infecto-Diarrstop® LGG® auf einem grünen Rezept.



Diese Broschüre ist nur für Fachkreise bestimmt.

1 Guarino et al., *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* (2014) **2** Jasinski et al. *Pediátrika* (2002) **3** Handbuch der Dt. Gesellschaft f. Pädiatrische Infektiologie (2018) **4** Hojsak et al., *Acta Paediatr.* (2018) **5** Seth et al., *Am. J. Physiol.: Gastrointest. Liver Physiol* (2008) **6** Tytgat et al., *PLoS One* (2016) **7** De Keersmaecker et al., *FEMS Microbiol Lett.* (2006) **8** Santos do Carmo et al., *Food Funct.* (2018)

InfectoDiarrstop LGG, – LGG Kirsch, – LGG Banane, – LGG Mono. **Zus.:** 1 Doppelkammerbeutel InfectoDiarrstop LGG mit 4,65 g (– LGG Kirsch: 4,84 g, – LGG Banane: 4,89 g) Pulver enth. 25 mg Lactobacillus rhamnosus GG, gefriergetr., entspr. mind. $5x10^9$ koloniebild. Einh., 840 mg Natriumcitrat (Ph. Eur.), 300 mg Kaliumchlorid, 200 mg Natriumchlorid, 1970 mg Glucose-Monohydrat (Ph. Eur.), 1281 mg D-Glucose. Sonst. Bestandt.: Sucrose, Aspartam, Maltodextrin, Natriumascorbat; – LGG Kirsch zusätzl.: Grenadine-Aroma, Rote-Bete-Pulver. – LGG Banane zusätzl.: Bananen- und Vanille-Aroma. 1 Beutel – LGG Mono mit 1,34 g Pulver enth. 25 mg Lactobacillus rhamnosus GG, gefriergetr., entspr. mind. $5x10^9$ koloniebild. Einh. Sonst. Bestandt.: D-Glucose, Sucrose, Aspartam, Maltodextrin, Natriumascorbat. **Anw.:** Therapie d. Diarrhö b. Säugl. u. Kleink. (– LGG Mono: in Komb. mit oraler Rehydratationslös.). **Gegenanz.:** Überempf. gg. einen d. Bestandteile; Niereninsuff., unstillb. Erbrechen, Bewusst.-trübung bzw. Schock b. schw. Dehydration od. metabol. Alkalose; Flüssigk.-mangelzust., z. B. b. akutem Darmverschluss. Bes. Vors. b. blutigem Stuhl od. Fieber. Bes. Vors. u. ärztl. Beobacht. da Risiko system. od. lokalisiert. Infektionen durch die Lactobazillen nicht abschätzbar bei Patienten mit folgend. Risikofaktoren: stark gestört. Immunstatus (z. B. HIV-Infekt. od. immunsuppr. Therapie), lebensbedrohl. Erkr. (z. B. Krebserkr., od. kompliziert. intensivmedizin. Krankheitsverläuf.), gestörte intestinal. Barriere (z. B. schwere gastrointestinale Grundkrankh., Kurzdarmsyndr.), liegend. Zentralvenenkathether. Ältere Kdr. (üb. 6 Jahre) u. Erw.: begrenzte Erfahr. z. Wirksamk. **Warnhinw.:** Enth. Aspartam als Quelle f. Phenylalanin, kann schädl. sein b. Phenylketonurie. Enth. Glucose u. Sucrose. Nicht geeig. b. heredit. Fructose-Intol., Glucose-Galactose-Malabs. od. Sucrase-Isomaltase-Mangel. 1 Doppelkammerbeutel InfectoDiarrstop LGG, – LGG Kirsch, – LGG Banane enth.: 12 mmol (276 mg) Natrium u. 4,02 mmol (157,2 mg) Kalium (zu berücksicht. b. eingeschr. Nierenfkt. sowie kontroll. Natrium- od. Kaliumdiät); ca. 3,1 g (– LGG Kirsch: 3,2 g, – LGG Banane: 3,3 g) verwertb. Kohlenhydr., zu berücks. b. Diabetes. **Nebenw.:** Bakteriämien u. Sepsis durch Lactobacillus rhamnosus GG bei Patient. m. bestimmten Risikofaktoren (s. unter Gegenanzeigen). Organe wie Herz od. Lunge können beteiligt sein; Überempf.-reakt. wie allerg. Exanth. u. Urtikaria. INFECTODIARRSTOP LGG, – LGG Kirsch und – LGG Banane zusätzl.: Kalium-bed. Magenreiz. m. Übelk. u. Erbr. **Apothekenpflichtig. Stand: 06/2017.**

6500148-20-0519

Ihr wissenschaftlicher Ansprechpartner:
Dr. Simon Braun

InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH
Von-Humboldt-Straße 1 · 64646 Heppenheim
Tel. 06252 95-7000 · Fax 06252 95-8844
www.infectopharm.com · kontakt@infectopharm.com

Kostenfreie Hotline: 0800 1136464

INFECTODIARRSTOP® LGG®

Orale Rehydration + *Lactobacillus rhamnosus* GG

Drei auf einen Streich!

- Höchste Evidenzstufe – Leitlinienkonform[1]
- Reduziert die Durchfalldauer signifikant[2]
- Zugelassen ab Geburt

INFECTOPHARM
Wissen wirkt.

INFECTODIARRSTOP® LGG®

Evidenzbasiert gegen Durchfall

Die Empfehlung der Europäischen Gesellschaft für Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung (ESPGHAN) ist eindeutig[1]:

- Höchste Evidenzstufe
- Starke Empfehlung
- Mit oraler Rehydratation effektiv in der Reduktion der Symptomdauer und -intensität

Durchfalldauer wird signifikant reduziert[2]



Gegenüber oraler Rehydratation alleine verkürzt Infecto-Diarrstop® LGG® die Durchfalldauer um durchschnittlich 2,4 Tage (p < 0,005, modifiziert nach Jasinski et al., 2002).[2]

Weniger protrahierte Verläufe

Infecto-Diarrstop® LGG® reduziert zudem die Häufigkeit protrahierter Diarrhöen (> 7 Tage) um 75 % im Vergleich zur alleinigen Rehydratation.[3]

DGPI (2018):

„LGG gehört zu den am besten untersuchen Probiotika."[3]

Was ist das Besondere an LGG®?

Zahlreiche Probiotika sind auf dem Markt erhältlich, doch viele dieser Präparate sind von zweifelhafter Qualität[4] – Vertrauen Sie deshalb Infecto-Diarrstop® LGG®. Das bedeutet höchste Arzneimittel-Qualität und -Wirksamkeit dank des seit Jahrzehnten bewährten *Lactobacillus rhamnosus* GG (LGG®).

Mittel der Wahl für Säuglinge

Vergleichen Sie	*Sacch. boulardii* z. B. Perenterol junior®	*E.coli* z. B. Mutaflor Suspension	Infecto-Diarrstop® LGG®
Zugelassen ab Geburt	✗	✓	✓
ORL inklusive	✗	✗	✓
Leitlinienkonform	✓	✗	✓