



ZIEGLER
Homöopathika ad us. vet.

Natürlich bewährte Tierarznei

Gebrauchsinformation

PHYTOLACCA S- *logoplex*[®]

Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Homöopathisches Arzneimittel
Für Tiere**

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe,
Ziegen, Hunde, Katzen, Heimtiere

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

ZIEGLER GmbH, Ötzer Str. 10, 86672 Thierhaupten,
Telefon: 08271-813111, Telefax: 08271-813112,
E-mail: info@ziegler-tierarznei.de

Darreichungsform und Inhalt:

Flüssige Verdünnung zur Injektion, 100 ml.

Zusammensetzung:

100 g (= 100 ml) Flüssige Verdünnung zur Injektion
enthalten: Wirkstoffe: Phytolacca americana Dil. D5
10,0 g, Acidum formicicum Dil. D4 10,0 g, Acidum
silicicum (Silicea) Dil. D10 10,0 g, Arnica montana
Dil. D6 10,0 g, Atropa bella-donna Dil. D6 10,0 g,
Calcium fluoratum Dil. D8 10,0 g, Calcium sulfuri-
cum Dil. D12 10,0 g, Hepar sulfuris Dil. D8 10,0 g,
Lophophytum leandri (Flor de piedra) Dil. D6 10,0 g.
Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für
Injektionszwecke.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher
ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Unter-
suchung erfolgen. Bei fortdauernden Krankheits-
symptomen während der Anwendung ist medizini-
scher Rat einzuholen.

Wechselwirkungen:

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei ho-
möopathischen Arzneimitteln Wechselwirkungen
mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn
PHYTOLACCA S-logoplex[®] gleichzeitig mit
einem anderen Arzneimittel angewendet
werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation:

Zur Verträglichkeit von **PHYTOLACCA S-**
logoplex[®] bei trächtigen und laktierenden Tieren
liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle
Arzneimittel sollten auch homöopathische Arznei-
mittel während der Trächtigkeit und Laktation nur
nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet
werden.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt. Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen. Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier / Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung:

Zur subkutanen Injektion. Entsprechend Tierart und Körpergewicht (KGW) beträgt die Einzeldosis:

Rind. Die Behandlung umfasst 3 Injektionen:
1. Tag: 10 ml; 3. Tag: 5 ml; 5. Tag: 5 ml
falls notwendig, Wiederholung nach 14 Tagen

Pferd 10 ml

Kalb, Schwein 5 ml

Ferkel, Schaf, Ziege. 3 ml

Hund. 0,2 ml pro kg KGW (max. 3 ml pro Tier)

Katze, Heimtiere. . . 0,2 ml pro kg KGW (max. 1 ml pro Tier)

Je nach Schwere der Erkrankung und Krankheitsverlauf Verabreichung über 3-5 Tage. Nicht länger als bis zur vollständigen Heilung des Tieres.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Eine Injektion dieses Arzneimittels sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen. Unsachgemäß durchgeführte Injektionen können zu bleibenden Schäden bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen führen. Nach der Applikation ist das Tier über einen angemessenen Zeitraum zu beobachten, um bei Anzeichen einer anaphylaktischen Reaktion sofort therapeutische Maßnahmen ergreifen zu können. Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Wartezeit:

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege

Essbare Gewebe 0 Tage

Pferd, Rind, Schaf, Ziege

Milch 0 Tage

Besondere Lagerungshinweise:

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Nicht über 25°C lagern. Nicht konserviert. Nach Anbruch in der Flasche verbleibende Reste sind zu verwerfen. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Genehmigungsdatum der Packungsbeilage:

Juni 2019

Weitere Angaben:

Apothekenpflichtig

Handelsform:

5x 100 ml

1x 100 ml

Hinweise für den Anwender

In der vet.-hom. Literatur werden die Bestandteile dieses Arzneimittels beschrieben. Einsatzschwerpunkte in der tierärztlichen Praxis: Rind: wiederholt auftretende hohe Zellzahl in der Milch, mit eventuell folgender Mastitis, ggf. auch aufgrund von Stoffwechselstörungen.